

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

## ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse  
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL :  
170 F.

BULLETIN N° 2 DU 23 JANVIER 1991

Nouveau n° de téléphone du S.R.P.V. : 61.24.70.70 - N° d'appel direct de la Section "GRANDES CULTURES" : 61.24.70.33

### Note commune CETIOM-SRPV (\*)

#### LUTTE CONTRE LE REVERDISSEMENT DES LABOURS AVANT TOURNESOL ET SOJA



En terres à forte cohésion (argilo-calcaires, terreforts), il est impossible, en labourant fin hiver, d'obtenir une terre suffisamment affinée au moment du semis. Pour cette raison, on a recours au labour précoce (Fin été, automne) qui laisse aux mottes le temps de se déliter sous l'action des alternances de gel et dégel, de pluies et de dessiccation.

Mais ce labour précoce, surtout en régions à hiver doux, se recouvre de mauvaises herbes. Leur destruction nécessite de nombreux passages d'outils générateurs d'une mauvaise structure, de tassement et de semelles.

Pour conserver une bonne structure du sol au semis, l'application d'un herbicide sur labour propre ou enherbé, courant hiver, réduit le nombre de façons superficielles et conserve une structure de sol favorable.

Plusieurs types de traitements sont conseillés :

#### ★ SUR LABOUR, AVANT OU APRES SORTIE DES MAUVAISES HERBES

Jusqu'à mi-Février, les produits suivants peuvent s'utiliser :

##### Contre graminées seules

LEGURAME à 4 kg/ha ; coût = 355 F. - 365 F.

KERB FLO à 1,8 l/ha ; coût = 420 F. - 430 F.

##### Contre graminées et dicotylédones

LEGURAME à 4 kg/ha + LINURON à 1,5 kg/ha ; coût = 450 F. - 460 F.

KERB FLO à 1,8 l/ha + LINURON à 1,5 kg/ha ; coût = 510 F. - 520 F.

(\*) CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains - Région S.O.  
SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux.



## ★ SUR LABOUR ENHERBE (TOUTES MAUVAISES HERBES LEVEES)

De fin Janvier à mi-Mars, utiliser :

Contre graminées plus dicotylédones (doses variables selon stades et nature des adventices)

ROUNDUP	1 à 3 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha (1) ; coût = 140 F. - 370 F.
STING ST	4 à 6 l/ha ; coût = 120 F. - 180 F.
BUGGY	2,5 à 4,5 l/ha ; coût = 200 F. - 400 F.
BASTA LS	à 5 l/ha ; coût = 440 F. - 460 F.

(1) Sur charbon, traitement possible jusqu'au semis et même entre semis et levée.

Ces produits éliminent les adventices en profondeur. Les racines détruites n'agglomèrent plus les mottes qui se délitent facilement.

## ★ AUTRES TYPES DE DESHERBAGE POSSIBLES

Application de fin Janvier à début Mars sur plantes levées et futures levées

WEEDAZOL TL	à 15 l/ha ; coût 360 F. - 380 F.
GIROR	6 l à 8 l/ha ; coût 230 F. - 305 F. ( <i>N'utiliser ce produit qu'avant semis de tournesol</i> )

Un délai de trois semaines minimum entre application de ces produits et le semis limitera les risques de phytotoxicité.

Application sur plantes levées jusqu'au semis

GRAMOXONE PLUS de 3 l à 4 l/ha + AGRAL 90 à 0,3 l/ha ; coût = 215 F. à 280 F.

Appliqué trop tardivement, ce traitement peut laisser subsister des touffes enracinées gênant le semis et ne permettant pas un affinement suffisant du sol.

Le désherbage de la culture se fait ensuite normalement sans tenir compte de ce traitement.